

Renseignements destinés aux patient·e·s

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

PrVIACORAM®

comprimés de perindopril arginine et d'amlodipine

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont rédigés pour la personne qui prendra **VIACORAM**. Il peut s'agir de vous ou d'une personne dont vous vous occupez. Lisez attentivement ces renseignements. Conservez-les, car vous devrez peut-être les relire.

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont un résumé. Ils ne sont pas complets. Si vous avez des questions au sujet de ce médicament ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet de **VIACORAM**, adressez-vous à un professionnel de la santé.

Encadré sur les « mises en garde et précautions importantes »

- VIACORAM ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Administré pendant la grossesse, VIACORAM peut provoquer des lésions ou même la mort du fœtus.
- Si vous constatez que vous êtes enceinte alors que vous prenez VIACORAM, arrêtez le traitement et consultez votre professionnel de la santé le plus tôt possible.

À quoi sert VIACORAM :

VIACORAM est utilisé chez les adultes (de 18 à 65 ans) pour traiter la pression artérielle élevée légère à modérée.

Comment fonctionne VIACORAM :

VIACORAM contient 2 ingrédients médicinaux, le perindopril arginine et l'amlodipine. Ils agissent ensemble pour maîtriser la pression artérielle.

- Le perindopril arginine fait partie d'une classe de médicaments appelés *inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine* (ECA). On reconnaît les inhibiteurs de l'ECA au nom de leur ingrédient médicinal qui se termine par « -PRIL ».
- L'amlodipine est un bloqueur des canaux calciques.

Ces deux médicaments agissent en relaxant les vaisseaux sanguins de manière à faciliter le passage du sang, ce qui aide à abaisser la pression artérielle.

Ce médicament ne guérit pas l'hypertension. Il aide à la maîtriser. Par conséquent, il est important de continuer de prendre VIACORAM de façon régulière, même si vous vous sentez bien. Ne cessez pas de prendre votre médicament sans consulter votre professionnel de la santé.

Les ingrédients de VIACORAM sont :

Ingrédients médicinaux : perindopril arginine et bésylate d'amlodipine

Ingrédients non médicinaux : cellulose microcristalline, lactose monohydraté, silice colloïdale hydrophobe et stéarate de magnésium

VIACORAM se présente sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes :

Comprimés : 3,5 mg / 2,5 mg, 7 mg / 5 mg et 14 mg / 10 mg de perindopril arginine / amlodipine (sous forme de bésylate d'amlodipine)

N'utilisez pas VIACORAM dans les cas suivants :

- vous êtes allergique :
 - au perindopril;
 - à l'amlodipine;
 - à tout autre ingrédient de VIACORAM;
 - à un autre inhibiteur de l'ECA (utilisé pour abaisser la pression artérielle);
 - aux médicaments appelés *dihydropyridines* (un type de bloqueur des canaux calciques, également utilisé pour baisser la pression artérielle).
- vous avez déjà eu une réaction allergique (angio-œdème) se manifestant par une enflure des mains, des pieds, des chevilles, du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, ou par une difficulté soudaine à respirer ou à avaler :
 - après avoir pris un autre inhibiteur de l'ECA;
 - en l'absence de cause connue (angio-œdème idiopathique).
- vous avez reçu un diagnostic d'angio-œdème héréditaire (un risque augmenté de faire une réaction allergique qui se transmet dans les familles).
- vous prenez un médicament contre l'insuffisance cardiaque qui contient du sacubitril/valsartan. Lorsque VIACORAM est administré avec du sacubitril/valsartan, le risque de réaction allergique grave (angio-œdème) est accru. Vous devez attendre au moins 36 heures après la prise de votre dernière dose de sacubitril/valsartan avant de commencer à prendre VIACORAM.
- vous avez des problèmes de reins, notamment :
 - un rétrécissement des vaisseaux sanguins dans un rein ou dans les deux reins (sténose de l'artère rénale);
 - vous êtes sous dialyse ou recevez tout autre type de filtration sanguine. Selon la machine utilisée, VIACORAM pourrait ne pas vous convenir.
- vous prenez déjà un médicament antihypertenseur (qui abaisse la pression artérielle) contenant de l'aliskirène **et** êtes atteint de diabète ou d'une maladie des reins.
- vous avez des problèmes de cœur, notamment :
 - une sténose aortique, un rétrécissement de la valve aortique;
 - des problèmes liés au muscle cardiaque (cardiomyopathie hypertrophique);
 - une insuffisance cardiaque.
- vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir, ou vous êtes capable de concevoir et n'utilisez pas une méthode de contraception fiable. La prise de VIACORAM durant la grossesse peut être néfaste, voire mortelle, pour votre bébé. Si vous tombez enceinte pendant le traitement par VIACORAM, cessez de prendre le médicament et informez-en votre professionnel de la santé **immédiatement**.
- vous allaitez ou prévoyez allaiter. VIACORAM passe dans le lait maternel.
- vous avez l'une de ces maladies héréditaires rares :

- Intolérance au galactose
 - Déficit en lactase de Lapp
 - Malabsorption du glucose-galactose
- car VIACORAM renferme du lactose.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser VIACORAM, afin d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment si:

- vous êtes d'origine africaine. Vous pourriez présenter un risque accru d'avoir une réaction allergique grave (angio-œdème) pendant le traitement par VIACORAM.
- vous présentez une augmentation sévère de la pression artérielle (crise hypertensive).
- vous avez une pression artérielle basse.
- vous prenez l'un ou l'autre des médicaments ci-dessous :
 - autres médicaments utilisés pour baisser la pression artérielle, tels que :
 - aliskirène
 - antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (ARA). On reconnaît les ARA au nom de leur ingrédient médicinal qui se termine par « -SARTAN »
 - autres inhibiteurs de l'ECA
 - diurétiques (comprimés pour « éliminer l'eau »)
 - certains anticancéreux (p. ex. temsirolimus, évérolimus)
 - médicaments utilisés pour maîtriser le diabète (inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 [DPP-IV]). On reconnaît les DPP-IV au nom de leur ingrédient médicinal qui se termine par « -GLIPTINE »;
 - médicaments contenant un inhibiteur de l'endopeptidase neutre (p. ex. sacubitril) pour traiter l'insuffisance cardiaque
 - allopurinol, utilisé pour traiter la goutte
 - procaïnamide, utilisé pour traiter les battements de cœur irréguliers
- vous êtes diabétique.
- vous avez des problèmes de foie ou de reins (y compris si vous avez subi une transplantation rénale).
- vous avez ou avez déjà eu une maladie ou un trouble qui cause une diminution du débit sanguin dans votre cœur ou votre cerveau (p. ex. cardiopathie ischémique ou maladie cérébrovasculaire, angine de poitrine, maladie coronarienne, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral).
- vous avez une maladie auto-immune qui provoque une inflammation de votre peau, de vos articulations ou de vos vaisseaux sanguins.
- vous êtes sous dialyse.
- vous êtes déshydraté(e), ou souffrez de vomissements, de diarrhée ou de transpiration excessifs.
- vous êtes à risque de voir augmenter votre taux sanguin de potassium (hyperkaliémie), ce qui peut être grave et peut survenir si vous prenez :
 - des succédanés du sel contenant du potassium
 - des suppléments de potassium
 - un type de comprimés pour éliminer l'eau (diurétique d'épargne potassique) qui favorise la rétention du potassium dans le corps (p. ex. spironolactone, éplérénone, triamtérène ou amiloride)

- des médicaments qui agissent sur le système immunitaire (p. ex. cyclosporine, tacrolimus, sirolimus)
- des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), utilisés pour traiter la douleur, la fièvre et l'inflammation
- de l'héparine, utilisée pour éclaircir le sang et prévenir les caillots
- d'autres médicaments pouvant augmenter le taux de potassium dans votre sang (p. ex. triméthoprime, un antibiotique souvent prescrit en association avec le sulfaméthoxazole)
- vous suivez un régime restrictif en sel.
- un professionnel de la santé vous a dit que votre sang était trop acide (acidose métabolique).
- vous avez récemment subi ou prévoyez subir une désensibilisation pour allergie aux piqûres d'abeilles ou de guêpes.
- vous présentez un état dans lequel votre corps libère en trop grande quantité une hormone appelée *aldostérone* dans votre sang (aldostéronisme primaire).
- vous êtes sous aphérèse des lipoprotéines de basse densité (LDL; un traitement visant à abaisser le taux de cholestérol LDL dans le sang).
- vous recevez des injections d'or (aurothiomalate de sodium).
- vous devez subir une chirurgie sous anesthésie, y compris une intervention dentaire.

Autres mises en garde :

VIACORAM peut causer des effets secondaires graves, notamment ceux-ci :

- **Réaction allergique et angio-œdème** : Des réactions allergiques et un angio-œdème (enflure du visage, des lèvres, de la langue, de la gorge, du tube digestif et des organes génitaux, ou difficulté à respirer ou à avaler) sont survenus chez des personnes qui prenaient VIACORAM. Ces réactions peuvent survenir à n'importe quel moment au cours du traitement par VIACORAM, même si vous utilisez ce médicament depuis longtemps sans problème. Dans de très rares cas, ces réactions ont été mortelles. Si vous éprouvez des symptômes de réaction allergique ou d'angio-œdème, cessez de prendre VIACORAM et obtenez de l'aide médicale immédiatement.
- **Hypotension (basse pression artérielle)** : Vous pourriez avoir une sensation d'étourdissement ou de vertige :
 - durant les quelques jours qui suivent le début de votre traitement par VIACORAM
 - lorsque votre dose est augmentée
 - lorsque vous faites de l'exercice
 - par temps chaud

Vous devriez vous étendre si cela se produit. Si vous perdez connaissance, cessez de prendre VIACORAM et communiquez avec votre professionnel de la santé.

- **Troubles sanguins** : Les inhibiteurs de l'ECA, dont VIACORAM, peuvent causer :
 - une neutropénie / agranulocytose (diminution du nombre de globules blancs)
 - une thrombocytopénie (faible nombre de plaquettes sanguines)
 - une anémie (faible nombre de globules rouges)

- **Hypoglycémie** (faible taux de sucre dans le sang) : VIACORAM peut provoquer une baisse du taux de sucre dans le sang chez les patients :
 - atteints de diabète qui prennent des antidiabétiques oraux ou de l'insuline
 - atteints de problème de reins

Vous devez surveiller étroitement votre glycémie, en particulier au cours de votre premier mois de traitement par VIACORAM.

Consultez le tableau **Effets secondaires graves et mesures à prendre** pour avoir plus d'information au sujet de ces effets et d'autres effets secondaires graves.

Sensibilité accrue de la peau au soleil : Votre peau pourrait devenir sensible au soleil durant le traitement par VIACORAM. Vous devez limiter votre exposition au soleil et au bronzage artificiel. Utilisez toujours un écran solaire (FPS de 30 ou plus) et portez des vêtements pour vous protéger du soleil lorsque vous sortez à l'extérieur. Si votre peau devient rouge et si elle démange après avoir été exposée au soleil, dites-le à votre professionnel de la santé.

Toux : Vous pourriez développer une toux sèche et persistante pendant que vous prenez VIACORAM. Cet effet disparaît habituellement lorsque vous cessez de prendre VIACORAM, ou lorsque votre dose est réduite. Si vous éprouvez ce symptôme, dites-le à votre professionnel de la santé.

Tests et examens médicaux : Votre professionnel de la santé pourrait vous faire passer des tests, y compris des analyses de sang avant que vous preniez VIACORAM et au cours de votre traitement. Ces analyses permettent de vérifier :

- votre pression artérielle
- le taux de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes dans votre organisme
- le bon fonctionnement de votre foie ou de vos reins
- les taux de potassium et de sodium dans votre sang

Intervention chirurgicale : Avant de subir une intervention chirurgicale ou une anesthésie générale (même chez le dentiste), assurez-vous de dire à votre professionnel de la santé que vous prenez VIACORAM. Votre pression artérielle peut baisser subitement lorsque vous êtes sous anesthésie générale. Votre professionnel de la santé pourrait vous demander de cesser de prendre VIACORAM le jour précédant votre intervention chirurgicale. Suivez ses directives à la lettre.

Conduite et utilisation de machines : Avant d'effectuer des tâches qui peuvent nécessiter une vigilance particulière, attendez de savoir comment vous réagissez à VIACORAM. Des étourdissements, des maux de tête, de la fatigue, des nausées, de la lassitude ou un évanouissement peuvent survenir, en particulier après la première dose et lorsque la dose est augmentée.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine parallèle.

Les produits suivants pourraient interagir avec VIACORAM :

- les médicaments utilisés pour baisser la pression artérielle, notamment :
 - les diurétiques (comprimés pour « éliminer l’eau »)
 - les médicaments contenant de l’aliskirène
 - les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine (ARA)
 - les autres inhibiteurs de l’ECA
 - les bloqueurs des canaux calciques (p. ex. vérapamil, diltiazem)
- les médicaments qui peuvent augmenter le taux de potassium dans votre sang, notamment :
 - les succédanés du sel contenant du potassium
 - les suppléments de potassium
 - les médicaments d’épargne potassique (p. ex. spironolactone, éplérénone, triamtérène, amiloride)
 - l’héparine, utilisée pour éclaircir le sang et prévenir les caillots
 - les médicaments qui agissent sur le système immunitaire (p. ex. cyclosporine, tacrolimus, sirolimus)
 - une classe de médicaments appelés *anti-inflammatoires non stéroïdiens* (AINS), utilisés pour traiter la douleur, la fièvre et l’inflammation (p. ex. acide acétylsalicylique [aspirine], ibuprofène, naproxène, célécoxib)
- les autres médicaments pouvant augmenter le taux sérique de potassium (p. ex. triméthoprim, un antibiotique souvent prescrit en association avec le sulfaméthoxazole)
- les médicaments utilisés pour traiter le diabète, notamment :
 - l’insuline
 - la metformine ou les autres antidiabétiques pris oralement
 - les agents de la classe des inhibiteurs de la DPP-IV (p. ex. sitagliptine, linagliptine et saxagliptine)
- l’allopurinol, utilisé pour traiter la goutte
- les médicaments de la classe des vasodilatateurs, y compris les nitrates (p. ex. nitroglycérine), utilisés pour traiter la douleur à la poitrine
- le procainamide, utilisé pour traiter les battements de cœur irréguliers
- les médicaments utilisés pour traiter les problèmes de santé mentale comme le trouble bipolaire, la dépression et les troubles psychotiques (p. ex. lithium, antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques)
- les médicaments utilisés pour traiter l’hypotension (basse pression artérielle), l’état de choc et l’asthme (p. ex. éphédrine, noradrénaline, adrénaline)
- le baclofène, un relaxant musculaire
- les antibiotiques, utilisés pour traiter les infections bactériennes (p. ex. rifampicine, érythromycine, clarithromycine)
- les médicaments utilisés pour traiter l’épilepsie (p. ex. carbamazépine)
- les médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques (causées par des champignons; p. ex. itraconazole, kétoconazole)

- les alpha-bloquants utilisés pour traiter l'hypertrophie de la prostate (p. ex. prazosine, alfuzosine, Idoxazosine, tamsulosine, térazosine)
- les corticostéroïdes, utilisés pour traiter l'inflammation
- les injections d'or (aurothiomalate de sodium), utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde
- les médicaments utilisés pour traiter l'infection par le VIH/le sida (p. ex. ritonavir, indinavir)
- le millepertuis, une herbe médicinale
- la simvastatine, utilisée pour abaisser le cholestérol
- la désensibilisation pour allergie aux piqûres d'abeilles ou de guêpes
- le tétracosactide (aussi appelée *cosyntropine*), utilisé comme agent diagnostique
- les médicaments contenant un inhibiteur de l'endopeptidase neutre (p. ex. sacubitril), utilisés pour traiter l'insuffisance cardiaque
- les traitements utilisant une machine qui prélève le sang pour le filtrer de ses impuretés, avant de le réinjecter dans l'organisme (aussi appelés *traitements extracorporels*). Il s'agit notamment de :
 - la dialyse ou l'hémodilution, un procédé qui élimine les déchets de l'organisme en remplacement des reins au moyen de membranes de polyacrylonitrile
 - l'aphérèse des lipoprotéines de basse densité (LDL), un traitement qui retire le cholestérol du sang au moyen du sulfate de dextran
- certains médicaments contre le cancer (p. ex. évérolimus, temsirolimus, estramustine)
- les anesthésiques, utilisés pour prévenir la douleur pendant une intervention chirurgicale
- le pamplemousse et le jus de pamplemousse

Comment utiliser VIACORAM :

- Prenez VIACORAM :
 - exactement comme il vous l'a été prescrit;
 - à la même heure chaque jour, de préférence **le matin** avant un repas;
 - en avalant le comprimé entier avec de l'eau.

Dose habituelle :

Vous et votre professionnel de la santé déterminerez la dose qui vous convient le mieux, selon vos besoins.

Surdose :

Les symptômes d'un surdosage peuvent comprendre les suivants :

- une pression artérielle basse
- des battements de cœur rapides
- un œdème pulmonaire (accumulation de liquide dans les poumons), provoquant un essoufflement. Cet effet peut apparaître jusqu'à 24 à 48 heures après pris trop de VIACORAM.

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop de VIACORAM, contactez immédiatement votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital, votre centre antipoison régional ou le numéro sans frais de Santé Canada, 1-844 POISON-X (1-844-764-7669), même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous oubliez de prendre une dose de votre médicament, sautez-la et prenez la dose suivante au moment habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

Effets secondaires possibles de l'utilisation de VIACORAM :

Voici certains des effets secondaires que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez VIACORAM. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

Parmi les effets secondaires pouvant survenir lors de la prise de VIACORAM, mentionnons les suivants :

- toux (souvent décrite comme sèche et irritante, généralement aggravée la nuit ou en position couchée)
- maux de tête
- symptômes semblables à ceux d'un rhume (écoulement nasal ou congestion nasale, mal de gorge, fièvre)
- sensation de malaise général
- diarrhée ou constipation
- nausées ou vomissements
- changements dans l'élimination des selles
- variations du poids
- sécheresse de la bouche
- modification du goût
- indigestion
- étourdissements ou vertige (sensation de tête qui tourne)
- fatigue, manque d'énergie, somnolence
- difficulté à dormir
- sensibilité à la lumière, rougeur de la peau, éruption cutanée, démangeaisons
- transpiration excessive
- bouffées de chaleur
- picotements (sensation de piqûres d'épingle sur la peau)
- douleur au dos ou à l'abdomen
- douleur ou spasmes musculaires
- douleur ou enflure articulaire

Effets secondaires graves et mesures à prendre à leur égard

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Très fréquent			
Œdème périphérique (enflure des mains, des chevilles ou des pieds causée par une rétention de liquide) : enflure ou gonflement des jambes ou des mains, sensation de lourdeur, de mal ou de raideur	X		
Fréquent			
Hyperkaliémie (trop de potassium dans le sang) : battements de cœur irréguliers, faiblesse musculaire et sensation de malaise général		X	
Toux persistante		X	
Peu fréquent			
Angio-œdème et réaction allergique grave : éruptions cutanées, urticaire, enflure du visage, des mains et des pieds, des organes génitaux, des lèvres, de la langue ou de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer, respiration sifflante, enflure du tube digestif provoquant des douleurs à l'estomac, de la diarrhée, des nausées ou des vomissements			X
Troubles sanguins : infections, fatigue, fièvre, malaises, douleurs et symptômes rappelant ceux de la grippe, apparition d'ecchymoses (bleus), saignement, faiblesse, apparition de petits points pourpres ou rouges sous la peau		X	
Bronchospasme : difficulté à			

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
respirer et à tousser, serrement de la poitrine, respiration sifflante ou bruit de sifflement accompagnant la respiration			X
Aggravation de l'angine de poitrine (douleur à la poitrine) : malaise dans l'épaule, le bras, le dos, la gorge, la mâchoire ou les dents, douleur ou pression dans la poitrine		X	
Accident vasculaire cérébral (AVC) (saignement ou caillot de sang dans le cerveau) : engourdissement soudain, faiblesse ou picotement du visage, d'un bras ou d'une jambe, en particulier d'un même côté du corps, mal de tête soudain, vision trouble, difficulté à avaler ou à parler, léthargie, étourdissement, évanouissement, vomissements, difficulté à comprendre, difficulté à marcher et perte d'équilibre			X
Dépression (humeur triste qui perdure) : difficulté à dormir ou le fait de trop dormir, changements d'appétit ou de poids, sentiments de dévalorisation, culpabilité, regret, impuissance ou désespoir, évitement des situations sociales, de la famille, des rassemblements et des activités avec les amis, baisse de la libido (désir sexuel) et pensées de mort ou de suicide		X	

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Déséquilibre électrolytique : faiblesse, somnolence, douleur ou crampes musculaires, battements de cœur irréguliers		X	
Dysfonction érectile : incapacité d'avoir ou de maintenir une érection	X		
Hyperglycémie (taux de sucre élevé dans le sang) : soif accrue, mictions (évacuation de l'urine) fréquentes, peau sèche, maux de tête, vision floue, fatigue	X		
Hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) : soif, besoin fréquent d'uriner, faim, nausées et étourdissements, battements de cœur rapides, picotements, tremblements, nervosité, transpiration, manque d'énergie		X	
Hypotension (faible pression artérielle) : étourdissements, évanouissements, vertiges. Peut se produire lors du passage de la position couchée ou assise à la position debout	X		
Problèmes de reins : changement de la fréquence des mictions (évacuation de l'urine), nausées, vomissements, enflure des extrémités, fatigue		X	
Infarctus du myocarde (crise cardiaque) : douleur ressentie comme une pression ou un serrement entre les deux omoplates, dans la poitrine, la mâchoire, le bras gauche ou la partie supérieure de l'abdomen,			X

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
essoufflement, étourdissements, fatigue, vertiges, peau moite, transpiration, indigestion, anxiété, sensation d'être sur le point de s'évanouir et possiblement battements de cœur irréguliers			
Pemphigoïde/pemphigus : formation de cloques de différentes grosseurs sur la peau			X
Rare			
Insuffisance rénale aiguë (problèmes de reins graves) : confusion, démangeaisons ou éruptions cutanées, gonflement du visage et des mains, enflure des pieds ou des chevilles, évacuation de l'urine moins fréquente ou absente, gain de poids			X
SIADH (syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique) : urines de couleur foncée, nausées, vomissements, crampes musculaires, confusion et crises (convulsions)		X	
Aggravation du psoriasis (maladie chronique de la peau) : formation de plaques rouges, prurigineuses (qui causent de la démangeaison) et écailleuses sur la peau		X	
Très rare			
Problèmes de foie : coloration jaune de la peau ou des yeux,			

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
urines de couleur foncée, douleur abdominale, nausées, vomissements, perte d'appétit		X	
Pancréatite (inflammation du pancréas) : douleur dans la partie supérieure de l'abdomen, fièvre, battements de cœur accélérés, nausées et vomissements, sensibilité de l'abdomen au toucher			X
Syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique (graves réactions cutanées) : toute combinaison d'éruption cutanée avec démangeaisons, rougeur, boursoufflement et desquamation de la peau et/ou de l'intérieur des lèvres, des yeux, de la bouche, des voies nasales ou des organes génitaux, avec fièvre, frissons, maux de tête, toux, douleurs corporelles ou ganglions enflés, douleur articulaire, jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée			X
Fréquence inconnue			
Symptômes extrapyramidaux : raideur musculaire, spasmes, roulement des yeux vers le haut, exagération des réflexes, hypersalivation, difficulté à bouger librement			X
Phénomène de Raynaud (épisodes de réduction de la circulation sanguine) : sensation de froid dans les doigts ou les orteils (et parfois le nez, les		X	

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
lèvres et les oreilles), sensation de piquûre ou de picotement, changement de la couleur de la peau qui passe au blanc puis au bleu			
Arythmie (anomalies du rythme cardiaque) : battements de cœur rapides, lents ou irréguliers		X	
Troubles urinaires : difficulté à uriner et douleur en urinant, envie pressante d'uriner, présence de sang dans les urines		X	
Érythème polymorphe (réaction allergique cutanée) : plaques de peau surélevées rouges ou violettes, pouvant comporter une cloque ou une croûte en leur centre, lèvres possiblement enflées, légères démangeaisons ou sensation de brûlure		X	

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables ([Canada.ca/medicament-instrument-declaration](https://canada.ca/medicament-instrument-declaration)) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur; ou
- En téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

Remarque : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation :

- Conserver à température ambiante (de 15 à 30 °C), à l'abri de la lumière.
- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur la boîte, la plaquette alvéolée ou le flacon.
- Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur VIACORAM :

- Parlez-en avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patient·e·s. Ce document se trouve sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>) et sur le site Web du fabricant (www.servier.ca) ou peut être obtenu en téléphonant au 1-800-363-6093.

Le présent feuillet été rédigé par Servier Canada Inc.

Date d'approbation : 2026-08-27